

ÜBER ERZEUGENDENSYSTEME VON FUCHSSCHEN GRUPPEN

DISSERTATION

zur Erlangung des Grades eines
Doktors der Naturwissenschaften
der Abteilung für Mathematik
an der
Ruhr-Universität Bochum

von

NORBERT PECZYNSKI

aus

Dortmund

Bochum 1975

1976

ÜBER ERZEUGENDENSYSTEME VON FUCHSSCHEN GRUPPEN

DISSERTATION

zur Erlangung des Grades eines
Doktors der Naturwissenschaften
der Abteilung für Mathematik
an der
Ruhr-Universität Bochum



von
NORBERT PECZYNSKI
aus
Dortmund

Bochum 1975



Dissertation eingereicht am: 9.12.1975

Tag der mündlichen Prüfung: 10.02.1976

Dekan: Prof. Dr. H. Amann

Referent: Prof. Dr. H. Zieschang

Korreferent: Prof. Dr. F. Levin

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
§ 1 Die Nielsensche Kürzungsmethode in freien Produkten mit Amalgam	3
§ 2 Über die Gleichung $\prod x_{v_i}^{\epsilon_i} = \prod_{i=1}^m s_i$ im freien Produkt zyklischer Gruppen	10
§ 3 Minimale Erzeugendensysteme von Fuchsschen Gruppen	27

Literaturverzeichnis



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41546609_0026

Einleitung

Es sei G eine ebene diskontinuierliche Gruppe mit kompaktem Fundamentalbereich. G besitzt dann eine Darstellung

$$G = \langle s_1, \dots, s_m, t_1, u_1, \dots, t_g, u_g \mid s_i^{\alpha_i} = \prod_{j=1}^m s_{ij}^{\alpha_{ij}} [t_j, u_j] = 1 \rangle.$$

In dieser Arbeit sollen die minimalen Erzeugendensysteme von G bis auf freie Äquivalenz [8] beschrieben werden. Ein System $\{x_1, \dots, x_k\}$ heie dabei minimal, falls $k = \text{rg}(G)$, dem Rang von G . Nach Satz 3 [6] ist der Rang von G

$$\begin{aligned} \text{rg}(G) &= 2g && \text{fr } m = 0 \\ \text{rg}(G) &= m-2 && \text{fr } m \text{ gerade, } g = 0 \text{ und alle } \alpha_i = 2 \\ &&& \text{bis auf eines, das ungerade ist} \\ \text{rg}(G) &= 2g+m-1 && \text{in allen anderen Fllen} \end{aligned}$$

G. Rosenberger beweist in [7, Satz 13] das folgende Resultat:
Ist $m \geq 2$, $g > 0$ und $\{x_1, \dots, x_{2g+m-1}\}$ ein minimales Erzeugendensystem von G , so gibt es einen freien bergang zu einem System der Form $\{s_{v_1}^{\gamma_1}, \dots, s_{v_{m-1}}^{\gamma_{m-1}}, t_1, u_1, \dots, t_g, u_g\}$ mit $v_1 < \dots < v_{m-1}$ und $(\gamma_i, \alpha_{v_i}) = 1$.

Hier wird ein analoger Satz fr den Fall $g = 0$ bewiesen (3.3).
Sei $G = \langle s_1, \dots, s_m \mid s_i^{\alpha_i} = \prod_{j=1}^m s_{ij}^{\alpha_{ij}} = 1 \rangle$, $m \geq 6$, $\alpha_i \geq 3$ und $\{x_1, \dots, x_{m-1}\}$ ein minimales Erzeugendensystem von G . Dann gibt es ein zu $\{x_1, \dots, x_{m-1}\}$ frei quivalentes System der Form $\{s_{v_1}^{\beta_1}, \dots, s_{v_{m-1}}^{\beta_{m-1}}\}$ mit $v_1 < \dots < v_{m-1}$ und $(\beta_i, \alpha_{v_i}) = 1$.

Die Voraussetzung $\alpha_i \geq 3$ lt sich nicht ohne weiteres verallgemeinern. G. Rosenberger gibt in [7] ein Gegenbeispiel fr den Fall, da einige $\alpha_i = 2$ sind.

$$G = \langle s_1, s_2, s_3, s_4 \mid s_1^{10} = s_2^2 = s_3^2 = s_4^5 = s_1 s_2 s_3 s_4 = 1 \rangle.$$

G wird erzeugt von $x_1 = s_1^4$, $x_2 = s_1 s_2$, $x_3 = s_1 s_3$ und es gibt keinen freien bergang zu einem System der oberen Art.

Der Beweis von 3.3 basiert, wie auch die Beweise in [7], [6] im wesentlichen auf der von H. Zieschang in [8] entwickelten Nielsenschen Krzungsmethode in freien Produkten mit Amalgam.

Im ersten Teil der Arbeit werden die wichtigsten Resultate noch einmal kurz aufgeführt und einige Folgerungen behandelt, die die Anwendung auf unseren Fall etwas vereinfachen. Der zweite Teil behandelt die Gleichung $\prod_{i=1}^k x_{v_i}^{\varepsilon_i} = (s_1 \dots s_m)^\alpha$ im freien Produkt der von den s_i erzeugten zyklischen Gruppen. Es stellt sich heraus, daß diese Gleichung im wesentlichen nur von $x_{v_i}^{\varepsilon_i} = s_j^{\beta_j}, (\beta_j, \alpha_j) = 1$ ($\alpha_j = \text{ord } s_j$) erfüllt werden kann (Satz 2.22). Der dritte Teil enthält den Beweis von Satz 3.3.

Ich möchte Herrn H. Zieschang für die Betreuung dieser Arbeit und für viele anregende Gespräche danken. Ebenfalls danke ich Herrn G. Rosenberger für manche wertvolle Diskussion.

§ 1 Die Nielsen'sche Kürzungsmethode in freien Produkten mit Amalgam

Es sei G eine Gruppe, in der eine Länge L definiert ist, also eine Abbildung $L : G \rightarrow \mathbb{N}$ mit $L(1) = 0$.

1.1 Definition.

Ein System $\{x_i\}_{i \in I} \subset G$ hat die Nielsen'sche Eigenschaft (bezüglich L), wenn gilt:

- (i) $L(x_i^\epsilon x_j^\mu) \geq \max\{L(x_i), L(x_j)\}$ für $i, j \in I$, $\epsilon, \mu = \pm 1$ und $i \neq j$ oder für $i = j$ $\epsilon = \mu = \pm 1$
- (ii) $L(x_i^\epsilon x_1 x_j^\mu) > L(x_i) - L(x_1) + L(x_j)$ für $i, 1, j \in I$, $\epsilon, \mu = \pm 1$, $i \neq 1 \neq j$, $x_1 \neq 1$ oder für $1 = i$ und $\epsilon = 1$ bzw. $j = 1$ und $\mu = 1$

Falls ein System die Nielsen'sche Eigenschaft hat, so liefert bei einem Produkt in den x_i , das frei gekürzt ist (also keine Stelle $x_{v_i}^\epsilon x_{v_i}^{-\epsilon}$, $\epsilon = \pm 1$, enthält), jedes x_i , das vorkommt, einen Beitrag. Es wird also kein x_i ganz gekürzt. Nielsen benutzte diese Eigenschaft, um die Untergruppen von freien Gruppen zu untersuchen [4]. Andere Anwendungen sind auch in [9] zu finden.

Nun kann man nicht in jeder Gruppe eine sinnvolle Länge definieren. Dies wurde etwa in [2] untersucht mit einigen Verallgemeinerungen in [1]. Im wesentlichen existiert eine Längenfunktion, die gewissen "natürlichen" Axiomen genügt, nur in freien Produkten.

Wir werden nur die beiden folgenden Längenbegriffe benötigen:

1. Sei $G = \bigstar_{i \in I} H_i$ das freie Produkt der Gruppen H_i .

Jedem $x \in G$, $x \neq 1$, kann eine Normalform zugeordnet werden [3]. $x = h_1 \dots h_n$, wobei die h_i abwechselnd aus verschiedenen Faktoren sind. Ferner sei $h_i \neq 1$, $i = 1, \dots, n$. Wir definieren dann $\Delta(x) := n$, $\Delta(1) = 0$. Es gilt $\Delta(x) = 0 \iff x = 1$.

2. Sei $G = \bigstar_{i \in I} H_i$ das freie Produkt der Gruppen H_i mit vereinigter Untergruppe A . Wir wählen in jedem Faktor H_i ein System von Repräsentanten der Linksrestklassen von H_i nach A . Die Untergruppe A werde jeweils durch 1 repräsentiert. Jedes $x \in G$ besitzt dann eindeutig eine Darstellung

$$x = ah_1 \dots h_n.$$

Dabei ist $a \in A$, und die h_i sind die Restklassenvertreter, die abwechselnd aus verschiedenen Faktoren sind und nicht gleich 1. Wir definieren dann:

$$L(x) = L(ah_1 \dots h_n) = n.$$

Es folgt $L(a) = 0$ für $a \in A$ und $L(x) = L(x^{-1})$. Es zeigt sich, daß die Länge L unabhängig von der Wahl des Repräsentantensystems ist [3].

Es erweist sich für uns als zweckmäßig, die Definition 1.1 etwas abzuändern.

1.2 Definition.

Sei G eine Gruppe mit Längenfunktion L . Ein System $\{x_i\}_{i \in I} \subset G$ hat die erweiterte Nielsensche Eigenschaft (N' -Eigenschaft), falls gilt:

- (i) $L(x_i^\epsilon x_j^\mu) \geq \max\{L(x_i), L(x_j)\}$ $i, j \in I, \epsilon, \mu = \pm 1$ und
 $i \neq j$ oder für $i = j$
 $\epsilon = \mu = \pm 1$
- (ii) $L(x_i^\epsilon x_1 x_1^\mu x_j^\mu) > L(x_i^\epsilon) - L(x_1) + L(x_j^\mu)$ $i, j, 1 \in I, \epsilon, \mu = \pm 1$,
 $i \neq 1 \neq j, x_1 \neq 1$ oder
 für $1 = i, \epsilon = 1$ und $1 \neq j$
 bzw. $1 = j, \mu = 1$ und $1 \neq i$

Im Fall, daß G ein freies Produkt ist, kann ein System, das ein Element enthält, das in einem Faktor liegt bzw. konjugiert zu einem Element eines Faktors ist, nicht die Nielsensche Eigenschaft haben. Es ist die Bedingung (ii) aus 1.1 nicht erfüllt. Es ist aber wohl möglich, daß ein solches System die N' -Eigenschaft hat.

Der Längenbegriff ist allein nicht ausreichend, um einem System, etwa in einer freien Gruppe [9], die Nielsensche Eigenschaft

zu geben. Es wird eine feinere Ordnung auf G benötigt. Um das für freie Produkte mit Amalgam zu tun, hat H. Zieschang in [8] eine etwas modifizierte Normalform für Elemente in G definiert, die sich als sehr zweckmäßig erweist.

1.3 Sei $G = \ast_{i \in I} A_i$ und r_j seien Rechtsrestklassenvertreter von A in den H_i bzw. l_j Linksrestklassenvertreter. Wir wählen als Linksrestklassenvertreter die Inversen der Rechtsrestklassenvertreter. Dann besitzt jedes $x \in G$ eine Darstellung

$$x = r_1 \dots r_m k l_m \dots l_1.$$

Dabei sind die $r_i, l_i \neq 1$ und abwechseln aus verschiedenen Faktoren. Der Zusammenhang mit der unter 2. definierten Länge L wird gegeben durch

$$\begin{aligned} \text{1.4} \quad L(x) &= 0 && \text{falls } m = 0, k \in A \\ L(x) &= 2m && \text{falls } m \geq 1, k \in A \text{ und } r_m, l_m \text{ aus verschiedenen Faktoren } H_i \\ L(x) &= 2m + 1 && \text{falls } k \in H_i, k \notin A \text{ und weder } l_m \text{ noch } r_m \text{ aus } H_i. \end{aligned}$$

$r_1 \dots r_m$ heißt die vordere Hälfte, $l_m \dots l_1$ die hintere Hälfte und k der Kern von x .

Der Vorteil dieser Normalform liegt darin, daß bei einem Produkt in den x_i ein Kürzen zum großen Teil auf ein freies Kürzen zurückgeführt werden kann.

Es soll nun eine Ordnung auf G eingeführt werden. Zunächst möge eine vollständige Ordnung der Faktoren und in jedem Faktor der Restklassenvertreter gegeben sein. Dabei werden r, r^{-1} nicht unterschieden. Ferner mögen die Produkte der Restklassenvertreter $r_1 \dots r_m$ ($r_i \neq 1$ und die r_i sind abwechselnd aus verschiedenen Faktoren) durch $<$ geordnet sein, so daß gilt

$$\begin{aligned} \text{1.5} \quad (a) \quad r_1 \dots r_m < r_1' \dots r_m' \text{ und } r_1' \dots r_m' < r_1 \dots r_m &\Rightarrow \\ r_1 \dots r_m &= r_1' \dots r_m' \\ (b) \quad r_1 \dots r_m < r_1' \dots r_m' &\Rightarrow r_1 \dots r_m r_{m+1} < r_1' \dots r_m' r_{m+1}' \\ &\text{für beliebige } r_{m+1}, r_{m+1}' \end{aligned}$$

- (c) Vor einem Produkt $r_1 \dots r_{m-1} r_m$ liegen nur endlich viele Produkte $r_1 \dots r_{m-1} r$, wobei r ein Restklassenvertreter aus demselben Faktor wie r_m ist.

Wir ordnen nun die Paare $\{x, x^{-1}\}$, $x \in G$. Dabei sei die Bezeichnung so gewählt, daß die vordere Hälfte von x bezüglich $<$ vor der von x^{-1} steht. Es sei

$$\{x, x^{-1}\} \prec \{x', x'^{-1}\},$$

falls

- (a) $L(x) < L(x')$ oder bei $L(x) = L(x')$
- (b) Die vordere Hälfte von x bezüglich $<$ echt kleiner ist als die vordere Hälfte von x' oder falls sie gleich sind
- (c) Die vordere Hälfte von x^{-1} vor der von x'^{-1} steht ($\leq$)

Gilt also $\{x, x^{-1}\} \prec \{x', x'^{-1}\}$ und $\{x', x'^{-1}\} \prec \{x, x^{-1}\}$, so unterscheiden sich x und x' nur im Kern.

1.6 Definition.

Ein System $X \subset G$ heie krzer als ein System $Y \subset G$, falls es Indizierungen $X = \{x_j\}_{j \in J}$ und $Y = \{y_j\}_{j \in J}$ gibt, so da $\{x_j, x_j^{-1}\} \prec \{y_j, y_j^{-1}\}$ fr alle $j \in J$, aber fr mindestens ein j nicht $\{y_j, y_j^{-1}\} \prec \{x_j, x_j^{-1}\}$ gilt.

Mit F_J bezeichnen wir die freie Gruppe in den freien Erzeugenden $\{f_j\}_{j \in J}$. Sei G eine Gruppe und $\{v_j\}_{j \in J}$ ein System von Elementen aus G . Durch $f_j \mapsto v_j$ wird ein Homomorphismus h von F_J auf die von den v_j in G erzeugte Untergruppe $\mathcal{U}$ definiert.

1.7 Definition.

Zwei Systeme $\{v_j\}_{j \in J}$ und $\{v'_j\}_{j \in J}$ von Elementen aus G heien frei quivalent, falls es einen Automorphismus α von F_J gibt, so da $h \circ \alpha(f_j) = v'_j$ fr alle $j \in J$ gilt. α induziert im allgemeinen auf $\mathcal{U}$ keinen Homomorphismus.

Im weiteren sei $G = H_1 \star_A H_2$ ein freies Produkt mit Amalgam. In G sei eine Lnge L und Ordnung definiert. H. Zieschang beweist in [8] den folgenden Satz.

1.8 Satz.

Sei $G = H_1 \star_A H_2$. $\{x_1, \dots, x_n\} \subset G$ sei ein System von Elementen von G . Dann gibt es ein zu $\{x_1, \dots, x_n\}$ frei äquivalentes System $\{y_1, \dots, y_n\}$, das höchstens kleiner als $\{x_1, \dots, x_n\}$ ist und eine der folgenden Eigenschaften hat.

(i) Für jedes $w \in \text{gp}\{y_1, \dots, y_n\}$ gibt es eine Darstellung

$$w = \prod_{i=1}^k y_{v_i}^{\varepsilon_i}, \varepsilon_i = \pm 1 \text{ mit } L(y_{v_i}) \leq L(w), i = 1, \dots, k$$

(ii) Es gibt ein Produkt $P = \prod_{i=1}^k y_{v_i}^{\varepsilon_i}$, $y_{v_i} \in A$, $P \neq 1$, und in einem Faktor H_1 ein Element $x \notin A$ mit $xPx^{-1} \in A$

(iii) Es gibt ein Produkt $P = \prod_{i=1}^k y_{v_i}^{\varepsilon_i}$, wobei nicht alle y_{v_i} in A liegen, so daß $P \in gAg^{-1}$ für ein geeignetes $g \in G$. Dabei liegen die y_{v_i} alle in einer zu einem Faktor

konjugierten Untergruppe. $\square$

Wir wollen nun annehmen, daß $\{x_1, \dots, x_n\}$ ein minimales Erzeugendensystem von $G = H_1 \star_A H_2$ ist. Wegen der Minimalität des Erzeugendensystems gelten dann folgende einfache Bemerkungen:

1.9 Sei $U \subset G$ eine Untergruppe von G . Dann ist die Anzahl der x_i , die in U liegt, höchstens gleich dem Rang von U . Jedes Teilsystem $\{x_{v_1}, \dots, x_{v_k}\}$ von $\{x_1, \dots, x_n\}$ erzeugt also eine Untergruppe vom Rang k . Es liegen also in H_1 , H_2 , A höchstens so viele x_i , wie der Rang von H_1 , H_2 , A angibt.

1.10 Sei $\{x_{v_1}, \dots, x_{v_k}\}$ ein Teilsystem von $\{x_1, \dots, x_n\}$, das die Untergruppe U von G erzeugt. Dann gibt es keine zu U konjugierte Untergruppe von G , in der mehr als ein weiteres x_j liegt.

Sind nämlich zwei weitere x_j in aUa^{-1} , so nimmt man an Stelle dieser x_j das a in das Erzeugendensystem und erhält einen Widerspruch zur Minimalität. $\square$

Wir erhalten nun das folgende Korollar zu Satz 1.8:

1.11 Korollar.

Sei $G = H_1 \star_A H_2$ ein freies Produkt mit Amalgam A . $\{x_1, \dots, x_n\}$ sei ein minimales Erzeugendensystem von G , das auch bezüglich der Länge und Ordnung in G minimal ist unter allen frei äqui-

valenten Systemen. Ferner mögen weder die Situation (ii) noch (iii) aus Satz 1.8 eintreten. Dann gibt es natürliche Zahlen $1 \leq k_1 \leq k_2 \leq n$, so daß

- (a) $x_1, \dots, x_{k_1} \in A$ und erzeugen A . Dabei ist $\text{rg} A = k_1$
- (b) $x_1, \dots, x_{k_1}, x_{k_1+1}, \dots, x_{k_2} \in H_1$ und erzeugen H_1 . Dabei ist $\text{rg} H_1 = k_2$
- (c) $x_1, \dots, x_{k_1}, x_{k_2+1}, \dots, x_n \in H_2$ und erzeugen H_2 . Dabei ist $\text{rg} H_2 = k_1 + n - k_2$

Beweis. Sei also $\{x_1, \dots, x_n\}$ ein minimales Erzeugendensystem von G . Nach Satz 1.8 bleibt also wegen der Voraussetzungen nur die Situation (i). Es gibt also für jedes $g \in G$ eine Darstellung als Produkt in den x_i , wobei die Länge der x_i kleiner oder gleich der Länge von g ist. Da $\{x_1, \dots, x_n\}$ ein Erzeugendensystem von G bildet, kann man $L(g) \leq 1$ wählen, und da das Erzeugendensystem minimal ist, muß jedes x_i einmal bei der Darstellung eines g mit $L(g) \leq 1$ auftreten. Es folgt $L(x_i) \leq 1$, $i = 1, \dots, n$. Wegen 1.8(i) lassen sich auch alle Elemente von A durch Elemente der Länge 0 darstellen. Ein Teilsystem von $\{x_1, \dots, x_n\}$, also etwa $\{x_1, \dots, x_{k_1}\}$, erzeugt damit A . Zusammen mit 1.9 folgt die Behauptung (a). Analog folgt (b) und (c). $\square$

Sei nun $G = H_1 *_A H_2$ und $\{x_1, \dots, x_n\}$ ein System von Elementen aus G . Wir schreiben die x_i nach Wahl der Restklassenvertreter wie in 1.3 in Normalform

$$x_i = r_{i_1} \dots r_{i_{m_i}} k_i l_{i_{m_i}} \dots l_{i_1}.$$

Ferner mögen die x_i der N' -Eigenschaft genügen. Eine Stelle von x_i ist dann eines der Symbole r_{i_n} , l_{i_n} oder k_i , falls $k_i \notin A$. Wie bei der Nielsenschen Eigenschaft kann man auch bei einem System, das der N' -Eigenschaft genügt, eine standhafte Stelle auszeichnen.

1.12 Hilfssatz.

Sei G und $\{x_1, \dots, x_n\}$ wie oben.

$$P = \prod_{j=1}^g x_{\nu_j}^{\epsilon_j} = r_1 \dots r_m k_l m \dots l_1$$

sei ein freige kürztes Produkt in den x_i . Ferner gelte:

$$v_i = v_{i+1} \Leftrightarrow v_{i-1} \neq v_i \text{ und } v_{i+2} \neq v_i$$

(Es treten also nie mehr als zwei gleiche x_i nebeneinander auf.)

Dann gibt es zu jeder Stelle u von P entweder einen Index i und eine Stelle v in $x_{v_i}^{\varepsilon_i}$, so daß $u = ava'$ ($a, a' \in A$), oder es gibt zwei Indices $i, i+1$ und Stellen v, v' von $x_{v_i}^{\varepsilon_i}$, $x_{v_{i+1}}^{\varepsilon_{i+1}}$, so daß $u = avv'a'$ ($a, a' \in A$) ist.

Ferner gibt es umgekehrt zu jedem i eine Stelle in P , an deren Bildung $x_{v_i}^{\varepsilon_i}$ in der oben beschriebenen Weise beteiligt ist.

Zum Beweis vergleiche [8, 2.21], [7, 2.5]. $\square$

Wir können also in jedem x_i eine standhafte Stelle auszeichnen, die aber im allgemeinen nicht eindeutig bestimmt ist.

§ 2 Über die Gleichung $\prod_{i=1}^m x_{v_i}^{\epsilon_i} = \prod_{i=1}^m s_i$ im freien Produkt

zyklischer Gruppen

Sei $G = \langle s_1, \dots, s_m \mid s_i^{\alpha_i} = 1 \rangle$, $\alpha_i > 2$. Wir führen in G die Länge Δ bezüglich der Zerlegung von G in ein freies Produkt zyklischer Gruppen ein. Ferner sei in G eine Ordnung wie in § 1 definiert.

2.1 Hilfssatz.

Sei $\{x_1, \dots, x_n\} \subset G$ ein bezüglich freier Äquivalenz und der in G definierten Ordnung minimales System von Elementen aus G . Dann gilt

- (i) Ein x_i ist konjugiert zu $s_j^{\alpha_j}$ für ein geeignetes j und $(\alpha, \alpha_j) \neq 1$
oder
- (ii) Die x_i haben die N' -Eigenschaft

Beweis. Angenommen, die x_i haben nicht die N' -Eigenschaft, d.h., es gibt x_i, x_k, x_l mit $\Delta(x_i^{\epsilon_i} x_k^{\epsilon_k} x_l^{\epsilon_l}) \leq \Delta(x_i) - \Delta(x_k) + \Delta(x_l)$. Also ist $x_k = w s_j^{\alpha_j} v$ und $x_i^{\epsilon_i} = w' s_j^{\beta_j} w^{-1}$ und $x_l^{\epsilon_l} = v^{-1} s_j^{\beta_j} w'$. Aus der Minimalität folgt dann $w = v^{-1}$ [8, Seite 8]. Ist nun $(\alpha, \alpha_j) = 1$, so gibt es ein β mit $x_k^{\beta} = w s_j^{\alpha_j} w^{-1}$ und damit wegen $x_i^{\epsilon_i} \cdot x_k^{-\beta \cdot \beta_i} = w' w^{-1}$ einen Widerspruch zur Minimalität von $\{x_1, \dots, x_n\}$. (Vergleiche auch [7, Satz 8]). $\square$

Wir wollen uns in den Untersuchungen auf den Fall (ii) des Hilfssatzes beschränken. Ein System $\{x_1, \dots, x_n\}$ hat also immer die N' -Eigenschaft.

2.2 Hilfssatz.

Sei $\{x_1, \dots, x_n\} \subset G$ und habe die N' -Eigenschaft, ($n \leq m$).
Es gelte eine Gleichung

$$(*) \quad y \left(\prod_{i=1}^m s_i \right)^{\alpha} y^{-1} = \prod_{j=1}^k x_{v_j}^{\epsilon_j}; \quad \alpha > 0,$$

wobei nicht alle x_{v_j} zu Potenzen von $\prod_{i=1}^m s_i$ konjugiert sind. Dann gibt es ein Produkt

$$(**) y' \left(\prod_{i=1}^m s_i \right)^{\epsilon_i} y'^{-1} = \prod_{j=1}^m x_{uj}^{\epsilon_j},$$

in dem nicht alle x_{uj} zu Potenzen von $\prod_{i=1}^m s_i$ konjugiert sind, das eine der folgenden Eigenschaften hat:

- (a) Es gibt ein x_i , das nicht zu einer Potenz von $\prod_{i=1}^m s_i$ oder eines s_j konjugiert ist und in (**) genau einmal auftritt.
- (b) Alle x_i , die in (**) auftreten und nicht zu Potenzen von s_j oder $\prod_{i=1}^m s_i$ konjugiert sind, treten genau einmal, jeweils mit Exponenten $+1$ und -1 , auf.

Beweis. Angenommen, es tritt der Fall (a) nicht ein. Wir geben einen Prozeß an, der die Anzahl der in der Gleichung (*) beteiligten x_i reduziert oder das in (*) auftretende α verkleinert, falls (b) nicht gilt. Es möge also (*) nicht die Bedingung (b) erfüllen. Das heißt, es gibt zwei Indices i, j mit $v_i = v_j = \kappa$ und $\epsilon_i = \epsilon_j$. Wir setzen obdA $\epsilon_i = \epsilon_j = 1$. Ferner möge $\epsilon_\lambda \neq 1$ gelten, falls $v_\lambda = \kappa$ und $i < \lambda < j$. Es sei nun $x_\kappa = u s_\lambda^\beta v$, wobei s_λ^β eine standardhafte Stelle von x_κ ist. Dann gilt

$$x_\kappa \left(\prod_{i=1}^{j-1} x_{v_i}^{\epsilon_i} \right) x_\kappa = u s_\lambda^\beta v \left(\prod_{i=1}^{j-1} x_{v_i}^{\epsilon_i} \right) u s_\lambda^\beta v = u s_\lambda^{\beta'} (s_\lambda \dots s_{m-1} s_1 \dots s_\lambda)^{\gamma} s_\lambda^{\beta''} v.$$

Ist nun $\gamma = 0$, so folgt aus der N' -Eigenschaft $i+1 = j$ und x_κ wäre konjugiert zu einer Potenz von s_λ . Das aber ist nach Annahme ausgeschlossen. Es folgt $\gamma > 0$. Analog wie in [6, 2.1] erhalten wir dann ein Produkt mit kleinerem α oder kleinerem k , in dem $\prod_{i=1}^m s_i$ ebenfalls noch x_i vorkommen, die nicht zu einer Potenz von $\prod_{i=1}^m s_i$ konjugiert sind. Nach endlich vielen Schritten tritt also der Fall (a) oder (b) ein. $\square$

Es soll nun die Gleichung

$$P = \prod_{i=1}^q x_{v_i}^{\epsilon_i} = \left(\prod_{i=1}^m s_i \right)^\alpha, \quad \alpha > 0$$

untersucht werden. Wir setzen dabei $m \geq 3$ voraus und wollen annehmen, daß P ein freige kürztes Produkt in den x_{v_i} ist. Es möge der Fall (b) von Hilfssatz 2.2 eintreten, d.h., es gibt ein x_{v_i} , das nicht zu einer Potenz von $\prod_{i=1}^m s_i$ konjugiert ist und alle x_{v_i} , die nicht zu einer Potenz von einem s_i oder $\prod_{i=1}^m s_i$ konjugiert sind, treten genau einmal, jeweils mit Exponenten $+1$ und -1 , auf.

2.3 Bemerkung.

Ist in P ein x_{vj} konjugiert zu s_j^α , so kann kein von x_{vj} verschiedenes Element etwas zu s_j^α beitragen. D.h.
 $x_{vj} = as_j^\alpha a^{-1}$, dann gibt es kein x_{vk} mit $x_{vk}^{\pm 1} = as_j^\beta w$.

Beweis. Gibt es ein solches x_{vk} , dann wäre $\Delta(x_{vj}x_{vj}x_{vk}^{\pm 1}) = \Delta(as_j^{2\alpha+\beta}w) \leq \Delta(x_{vk})$ im Widerspruch zur N' -Eigenschaft. $\square$

Wir wollen nun Potenzen von s_j oder $\prod_{i=1}^m s_i$ konjugierten x_{vi}^e in P zusammenfassen und erhalten ein Produkt

$$P = \prod_{j=1}^{g'} x_{vj}^{\mu_j} = \left(\prod_{i=1}^m s_i \right)^\alpha, \quad \alpha > 0, \mu = \pm 1, x_{vi}^{\pm 1} \neq 1,$$

wobei zwei benachbarte $x_{vi}^{\pm 1}$ nicht mit dem gleichen Konjugationsfaktor zu Potenzen desselben s_j oder $\prod_{i=1}^m s_i$ konjugiert sind.

Es ist $x_{vj}^{\pm 1} = x_{vi}$ für ein i , falls $x_{vi}^{\pm 1}$ weder zu einem s_j noch zu $\prod_{i=1}^m s_i$ konjugiert ist.

Es gilt

2.4 Hilfssatz.

Die $x_{vi}^{\pm 1}$ haben die N' -Eigenschaft.

Beweis. Wegen 2.3 ist ein $x_{vi}^{\pm 1}$, das aus einer Potenz von Elementen entstanden ist, die zu einem s_j konjugiert waren, gleich $as_j^\alpha a^{-1}$, kann also nicht über die Hälfte gekürzt werden. Die anderen $x_{vi}^{\pm 1}$ stammen von x_{vi} , die nicht zu einer Potenz eines s_j konjugiert sind. Sie haben nach [7, 2.5] die Nielsensche Eigenschaft.

Die Behauptung folgt nun aus 2.3 zusammen mit [9, Seite I. 12]. $\square$

In jedem $x_{vi}^{\pm 1}$ zeichnen wir ein standhaftes Zeichen aus. Tritt $x_{vi}^{\pm 1}$ mit Exponenten $+1$ und -1 auf, so ist das standhafte Zeichen wegen $m \geq 3$ aus Gründen der Reihenfolge eindeutig bestimmt.

2.5 Es sei ein $x_{vi}^{\pm 1}$ konjugiert zu einer Potenz von $\prod_{i=1}^m s_i$ mit positivem Exponenten. Die Normalform von $x_{vi}^{\pm 1}$ in G hat die Gestalt

(1) $a(s_j \dots s_m s_1 \dots s_{j-1})^\gamma a^{-1}$, $\gamma > 0$, wobei a weder mit s_j^{-1} noch mit

s_{j-1} endet und Normalform in G hat.

Es gilt

- (2) In dem Produkt P kann höchstens das a gekürzt werden.
 (3) OBdA können wir annehmen, daß der Konjugationsfaktor ungleich 1 ist.

Beweis. Zu (2): Wird in P mehr als das a gekürzt, so gibt es ein Element x'_{v_k} mit $x'_{v_k} = a(s_{j-1}^{-1} \dots s_j^{-1})^{\beta} s_{j-1}^{-1} \dots s_k^{-1} w$, wobei $\beta < \gamma$ und w nichts von x'_{v_i} kürzt. Es folgt $x'_{v_i} x'_{v_k} = a(s_j \dots s_m s_1 \dots s_{j-1})^{\gamma-\beta-1} (s_j \dots s_{k-1}) w \pmod{m}$. Da s_{k-1} nicht gekürzt werden kann (N' -Eigenschaft), muß das erste Zeichen von w eine Potenz von s_k sein. $\#$

Zu (3): Ist der Konjugationsfaktor gleich 1, so können wir wegen (2) die Anzahl der in P auftretenden x'_{v_i} verkleinern. $\square$

2.6 Es sei ein x'_{v_i} konjugiert zu einer Potenz von $\prod_{i=1}^m s_i$ mit negativem Exponenten. x'_{v_i} hat die Normalform

- (1) $a(s_j^{-1} \dots s_1^{-1} s_m^{-1} \dots s_{j+1}^{-1})^{\gamma} a^{-1}$, $\gamma > 0$, a endet weder mit s_j noch mit s_{j+1}^{-1} und hat Normalform.

Es gilt

- (2) In dem Produkt müssen alle s_j bis auf eines, s_k^{-1} , in x'_{v_i} gekürzt werden und dieses eine wird mit s_k^2 multipliziert.

Beweis. (2) folgt wegen $m \geq 3$ aus Gründen der Reihenfolge bzw. wegen $\alpha_k \neq 2$. $\square$

Vorerst wollen wir annehmen, daß in P keine x'_{v_i} auftreten, die mit negativem Exponenten zu einer Potenz von $\prod_{i=1}^m s_i$ konjugiert sind.

2.7 Definition.

Es sei P wie oben. Wir definieren $M = \{y_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ durch

(i) $y_1 = x'_{v_1} e_1$

(ii) y_k sei das auf y_{k-1}^{-1} folgende Zeichen in P , falls

y_{k-1}^{-1} auftritt, sonst sei es das auf y_{k-1} folgende $x_{v_i}^{e_i}$.
Ist y_{k-1}^{-1} bzw. y_{k-1} das letzte Zeichen in P , so sei y_k
und alle folgenden y_j gleich 1.

Die erste Hälfte des freige kürzten Wortes y_i sei der Anfangsteil von y_i bis zum standhaften Zeichen. Ist y_i zu einer Potenz von s_j konjugiert, so bezeichne der Konjugationsfaktor die erste Hälfte. Die erste Hälfte eines y_i , das zu einer Potenz von $\prod_{i=1}^m s_i$ konjugiert ist, sei gleich dem in 2.5 (1) definierten a .

Analog sei die zweite Hälfte eines y_i erklärt.

$A(y_i)$ bezeichne ein Anfangsteilwort von y_i , das höchstens gleich der ersten Hälfte von y_i ist. Ein Schritt in der Folge $\{y_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ sei der Übergang von y_i nach y_{i+1} .

2.8 Hilfssatz.

Sei $A(y_i)$ ein Anfangsteilwort von y_i , das ebenfalls ein Anfangsteilwort von $y_i, \dots, y_{i+k}$ ist. Ferner sei λ der Index des Zeichens, das auf $A(y_i)$ bei y_i folgt. Dann ist der Index des Zeichens, das auf $A(y_i)$ bei y_{i+1} , $1 \leq k$, folgt, nicht größer als $\lambda+1$, d.h. der Index steigt pro Schritt um höchstens 1.

Beweis. Betrachte den Schritt von y_{i+s} auf y_{i+s+1} ($s+1 \leq k$). Wir wollen annehmen, daß der Index des Zeichens, das bei y_{i+s} auf $A(y_i)$ folgt, höchstens gleich $\lambda+s$ ist.

(1) $A(y_i)$ wird bei y_{i+s+1} in P gekürzt.

Denn folgt y_{i+s+1} in P auf y_{i+s} , so ist y_{i+s} konjugiert zu einer Potenz von einem s_i oder von $\prod_{i=1}^m s_i$ und $A(y_i)$ ein Teil des Konjugationsfaktors. Also endet y_{i+s} mit $A(y_i)^{-1}$. Folgt y_{i+s+1} auf y_{i+s}^{-1} , so gilt (1), da y_{i+s} mit $A(y_i)$ beginnt.

(2) Ist $A(y_i)$ gleich der ersten Hälfte von y_{i+s} , so gilt die Behauptung.

Denn folgt y_{i+s+1} auf y_{i+s}^{-1} , so ist das standhafte Zeichen eindeutig bestimmt, und das Zeichen vor $A(y_i)^{-1}$ bei y_{i+s}^{-1} hat einen Index höchstens gleich $\lambda+s$ und ist standhaft. Das Zeichen nach

$A(y_i)$ bei y_{i+s+1} hat also den Index um höchstens eins größer als der von y_{i+s} . Genauso folgt die Behauptung, falls y_{i+s} konjugiert zu einem s_j ist. Ist y_{i+s} konjugiert zu einer Potenz $\prod_{i=1}^m s_i$, folgt die Behauptung wegen 2.5 (1), (2).

(3) Ist $A(y_i)$ nicht gleich der ersten Hälfte von y_{i+s} , so gilt die Behauptung.

Denn vor $A(y_i)^{-1}$ bei $y_{i+s}^{\pm 1}$ steht das Zeichen, das bei $y_{i+j}^{\pm 1}$, $j \leq s$, nach $A(y_i)$ vorn stand, wobei j minimal ist bezüglich der Eigenschaft, daß $A(y_i)$ nicht gleich der ersten Hälfte von y_{i+j} ist. $\square$

2.9 Hilfssatz.

$A(y_{i_0})$ sei ein Anfangsteilwort von y_{i_0} . $A(y_{i_0})$ ende mit einer Potenz von s_λ . Ist das auf $A(y_{i_0})$ folgende Zeichen eine Potenz von $s_{\lambda+1}$ ($\lambda+1 \bmod m$), so beginnen $y_{i_0}, \dots, y_{m-2+i_0}$ mit $A(y_{i_0})$.

Beweis. Für y_{i_0} ist die Behauptung trivial. Beim Schritt von y_k auf y_{k+1} sieht die Situation folgendermaßen aus

$$\dots A(y_{i_0})^{-1} y_{k+1}.$$

Dabei ist $A(y_{i_0})^{-1}$ der letzte Teil von y_k^{-1} bzw. y_k , falls y_k^{-1} nicht auftritt. Kürzt nun y_{k+1} das ganze $A(y_{i_0})$, so gilt die Behauptung. Angenommen also, $k+1$ sei die erste Stelle, wo nicht das ganze $A(y_{i_0})^{-1}$ gekürzt wird. Insbesondere bleibt dann das erste Zeichen von $A(y_{i_0})^{-1}$, das den Index λ hat, stehen. l_k sei der Index des Zeichens von y_k , das auf $A(y_{i_0})$ bei y_k folgt. Es gilt

$$\lambda \equiv l_k + 1(m), \text{ da das Zeichen in } P \text{ beim Schritt von } y_k \text{ zu } y_{k+1} \text{ stehenbleibt.}$$

Daraus folgt

$$l_k - (\lambda - 1) = m - 2 \text{ oder } l_k - (\lambda + 1) = -2.$$

Ferner gilt

$$\lambda + 1 \leq l_k \leq \lambda + 1 + (k - i_0) \text{ oder } 1 \leq l_k \leq \lambda + 1 + (k - i_0) - m,$$

da der Index des Zeichens nach $A(y_{i_0})$ wegen 2.8 pro Schritt um höchstens eins steigen kann.

Es folgt

$$0 \leq 1_k - (\lambda+1) \leq k - i_o \text{ oder } 1_k - (\lambda+1) \leq k - i_o - m \leq 0.$$

Insgesamt

$$m-2 \leq k - i_o \text{ oder } -2 \leq k - i_o - m.$$

Diese Ungleichungen können für $i_o \leq k < m-2+i_o$ nicht erfüllt werden. Es kann also nichts von $A(y_{i_o})$ stehenbleiben. (Vergleiche auch [6, 2.4].) $\square$

Erfüllt die erste Hälfte eines y_i die Voraussetzungen von Hilfssatz 2.9, d.h. die erste Hälfte endet mit einer Potenz eines s_λ und das folgende Zeichen hat einen Index $\equiv \lambda+1$, so wollen wir $y_i, \dots, y_{i+m-2}$ einen Block nennen.

2.10 Hilfssatz.

In einem Block können keine zwei y_i zueinander invers sein.

Beweis. Angenommen, es gilt $y_h = y_j^{-1}$ in einem Block. Dabei sei $h < j$. Sei i_o maximal mit der Eigenschaft, daß y_h und y_j in dem mit y_{i_o} beginnenden Block liegen. Es gilt dann:

$$y_h = A(y_{i_o}) S_{1_h}^{y_h} A(y_{i_o})^{-1} = y_j^{-1}.$$

Dabei sei $A(y_{i_o})$ gleich der ersten Hälfte von y_{i_o} , d.h. $S_{1_h}^{y_h}$ ist das standhafte Zeichen von y_h und $\Delta(a) = 1$ oder $a = 1$. a kann höchstens die Länge 1 haben, da das standhafte Zeichen in der Mitte stehen muß. Gilt $\Delta(a) = 1$, so folgt, daß der Index des standhaften Zeichens pro Schritt um höchstens 1 steigt (2.8) bis auf die Stelle, wo sich die Länge der ersten Hälfte vergrößert, wo also a eingeschoben wird. Hier kann er, wegen $\Delta(a) = 1$, um höchstens 2 steigen. Wegen $1_j \equiv 1_h(m)$ müssen y_j und y_h also mindestens m Schritte auseinander liegen. Da aber ein Block nur $m-1$ der y_k enthält, kann das nicht sein.

Ist $a = 1$, so ergibt sich ein Widerspruch wie oben oder das standhafte Zeichen von y_{k+1} hat auch den Index 1_h . Also $y_h = A(y_{i_o}) S_{1_h}^{y_h} A(y_{i_o})^{-1}$ und $y_{h+1} = A(y_{i_o}) S_{1_h}^{y_{h+1}} \dots$, was aber wegen 2.3 unmöglich ist. $\square$

Wir definieren nun analog zu den y_i eine Folge z_i .

2.11 Definition.

Es sei $\{z_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ definiert durch

- (i) $z_1 = x_{v_q}^{l_q}$, das letzte $x_{v_j}^e$ von P
- (ii) z_k sei das vor z_{k-1}^{-1} bzw. z_{k-1} , falls z_{k-1}^{-1} nicht auftritt, in P stehende $x_{v_j}^e$. Ist z_{k-1}^{-1} bzw. z_{k-1} das erste Zeichen des Produktes, so sei $z_i = 1$, $i \geq k$.

Analog zu den y_i bezeichne $E(z_i)$ ein Endteilwort von z_i . Wir erhalten dann die zu 2.8, 2.9 und 2.10 analogen Hilfssätze:

2.12 Hilfssatz.

Sei $E(z_i)$ ein Endteilwort von z_i , das ebenfalls Endteilwort von $z_1, \dots, z_{i+k}$ ist. Ferner sei μ der Index des Zeichens, das vor $E(z_i)$ bei z_i steht. Dann ist der Index des Zeichens, das vor $E(z_i)$ bei z_{i+1} , $1 \leq k$, steht, nicht kleiner als $\mu-1$, d.h. der Index sinkt pro Schritt um höchstens eins. $\square$

2.13 Hilfssatz.

Sei μ der Index des ersten Zeichens von $E(z_i)$. Steht vor $E(z_i)$ ein Zeichen mit dem Index $\equiv \mu-1$, so enden $z_1, \dots, z_{m-2+i}$ mit $E(z_i)$. $\square$

Analog zu den y_i sei auch bei den z_i ein Block definiert. Es gilt dann

2.14 Hilfssatz.

In einem Block der z_j können keine zwei z_k zueinander invers sein. $\square$

2.15 Bemerkung.

Es ist keines der y_i , $i \leq m$, gleich 1. Analog ist keines der z_j , $j \leq m$, gleich 1.

[illegible]

2. 2. 2. 2.

[illegible][illegible]

第 1 章 緒 論
 1.1 研究背景及意義
 1.2 研究目的及內容
 1.3 研究方法及技術路線
 1.4 論文結構

1. 凡在本行存款，利息按日计算，按月结息。

[illegible]

— 10 —

知 / 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

[illegible]

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem.

2. In the second part, we shall consider the case of a homogeneous medium.

3. The third part is devoted to the case of an inhomogeneous medium.

4. In the fourth part, we shall consider the case of a medium with a periodic structure.

5. The fifth part is devoted to the case of a medium with a random structure.

2. The second part of the paper is devoted to a general discussion of the problem.

2.1. In the first part, we shall consider the case of a homogeneous medium.

2.2. In the second part, we shall consider the case of an inhomogeneous medium.

2.3. In the third part, we shall consider the case of a medium with a periodic structure.

2.4. In the fourth part, we shall consider the case of a medium with a random structure.

2.5. In the fifth part, we shall consider the case of a medium with a periodic structure.

2.6. In the sixth part, we shall consider the case of a medium with a random structure.

2.7. In the seventh part, we shall consider the case of a medium with a periodic structure.

2.8. In the eighth part, we shall consider the case of a medium with a random structure.

geben kann. Darüberhinaus lassen wir zu, daß wie bei Satz 2.16 bei P auch Konjugierte zu positiven Potenzen von $\prod_{i=1}^m s_i$ auftreten können. Wir nehmen also an, daß nicht alle y_i gleich Potenzen der s_j sind.

Sei y_k das erste Element, das nicht gleich einem s_j ist. Wegen der Bemerkung 2.3 gilt dann: y_k beginnt mit s_k .

2.18 Es gilt $k \leq 2$.

Beweis. Jedes der y_i , das nicht gleich einem Konjugierten einer (positiven) Potenz von $\prod_{i=1}^m s_i$ ist, besitzt genau ein standhaftes Zeichen. Falls also bei keinem der y_i ein nicht standhaftes Zeichen auftritt, ergibt sich für $y_i \neq b(\prod_{i=1}^m s_i)^{\alpha} b^{-1}$ $\Delta(y_i)_m = 1$. Das heißt, falls kein Element konjugiert zu einer Potenz von $\prod_{i=1}^m s_i$ ist, tritt dann der Fall (b) des Satzes ein.

Falls doch ein y_i zu $(\prod_{i=1}^m s_i)^{\beta}$ konjugiert ist, ist ein Produkt P nicht möglich. Es gibt also ein y_i , das ein nicht standhaftes Zeichen besitzt.

y_{i_0} sei das erste Element, das ein nicht standhaftes Zeichen s_{j_0} vorn besitzt. Wir haben also $A(y_{i_0}) \neq 1$ und erhalten nach Hilfssatz 2.9 und 2.10 $m-1$ verschiedene y_i , die alle mit s_{j_0} beginnen. Also erhalten wir $m-1$ verschiedene y_j , die nicht gleich einer Potenz von einem s_k sind. Wegen $n \leq m$ folgt dann die Behauptung. $\square$

Analog sei z_1 das erste Element, das nicht gleich einem s_j ist. Es folgt $1 \leq 2$. Für $(k,1)$ ergeben sich also die folgenden Möglichkeiten, die alle zum Widerspruch geführt werden sollen:

$$(k,1) = (1,1), (1,2), (2,1).$$

2.19 $(k,1) = (1,2)$

$$y_1 = s_1 s_p^{\beta} \quad (\text{da } s_1 \text{ standhaft, keine Potenz})$$

$$y_2 = s_1^2 s_q^{\gamma} \dots \quad (\text{wegen } \alpha_1 \neq 2)$$

$$z_1 = s_m$$

(a) s_{m-1} sei bei z_2 standhaft.

Wir erhalten

$$\begin{aligned} z_1 &= s_m \\ z_2 &= s_o^{\beta_1} s_{m-1} \\ z_3 &= \dots s_{m-1}^2 \quad (\text{da } \alpha_{m-1} \neq 2) \end{aligned}$$

Ist nun s_1^2 bei y_2 nicht standhaft, so beginnen nach Hilfssatz 2.9 $y_2, \dots, y_m$ mit s_1^2 und sind nach Hilfssatz 2.10 alle verschieden. Das ergibt wegen $n \leq m$ und $z_1 = s_m$ einen Widerspruch.

Also ist s_1^2 standhaft. Nach Hilfssatz 2.12 kann der Index des standhaften Zeichens von z_1 , angefangen bei z_2 , pro Schritt um höchstens 1 sinken, bis auf die Stelle, wo ein nicht standhaftes Zeichen eingeschoben wird. Wegen $\Delta(y_2) = 2$ kann er hier nur um maximal 2 sinken. Um also bei y_2 s_1^2 als standhaftes Zeichen vorn zu erhalten, brauchen wir von z_2 an mindestens $m-2$ Schritte, d.h. s_{m-1}^2 kann bei z_3 nicht standhaft sein. Ist s_{m-1}^2 aber nicht standhaft, so kann der Index des standhaften Zeichens von z_3 an um maximal 1 pro Schritt sinken ($\Delta(y_2) = 2$) und wir können keine zwei Elemente mit s_1 als standhaftem Zeichen erhalten, denn das standhafte Zeichen von z_3 hat den Index $m-2 \pmod{m}$.

(b) s_{m-1} bei z_2 ist nicht standhaft.

Nach Hilfssatz 2.13 enden dann $z_2, \dots, z_m$ mit s_{m-1} und wegen $\alpha_{m-1} \neq 2$ endet auch z_{m+1} mit einer Potenz von s_{m-1} . z_{m+1} beginnt und endet also mit einer Potenz von s_{m-1} , da es nach Hilfssatz 2.14 wegen $z_1 = s_m$ zu einem der z_i , $2 \leq i \leq m$, invers sein muß.

Also muß auch ein y_i mit einer Potenz von s_{m-1} beginnen und enden. Ist aber einmal das erste Zeichen von einem y_i nicht standhaft, so beginnen nach Hilfssatz 2.9 $m-1$ weitere y_j mit diesem Zeichen, die außerdem nach Hilfssatz 2.10 alle verschieden sind und mit z_1 zusammen alle x_v ausmachen. Es muß also bei den y_i das erste Zeichen standhaft sein, bis s_{m-1} eingeschoben werden kann. Wegen Hilfssatz 2.8 kann das standhafte Zeichen aber von y_2 an pro Schritt um höchstens 1 steigen, wir brauchen also $m-2$ Schritte, um zu einem standhaften Zeichen mit dem Index $m-2$ zu gelangen. Das kann aber frühestens bei y_{m-1} der Fall sein. Aber zusammen

mit z_1 haben wir dann bereits alle x_v verbraucht. Der Fall (b) und somit 2.19 sind unmöglich.

2.20 $(k,1) = (2,1)$

$$y_1 = s_1$$

$$y_2 = s_2 \dots$$

(a) s_m bei z_1 ist nicht standhaft.

$z_1, \dots, z_{m-1}$ enden also nach Hilfssatz 2.13 mit s_m und wegen $\alpha_m \neq 2$ endet auch z_m mit einer Potenz von s_m . z_m ist also invers zu einem der z_i , $i \leq m-1$, und beginnt und endet mit einer Potenz von s_m . Wie vorher folgt für die y_i aus Hilfssatz 2.8, daß das erste Zeichen von y_i , $i \leq m-1$, standhaft sein muß, da wir s_m als erstes Zeichen bei z_m bekommen müssen. Ist jedoch s_2 standhaft bei y_2 , so beginnt wegen $\alpha_2 \neq 2$ y_3 mit s_2^2 und wir erhalten einen Widerspruch.

(b) s_m bei z_1 standhaft.

Der Fall ist dual zu 2.19, indem man die y_i durch die z_i ersetzt.

Somit ist 2.20 auch nicht möglich. Es bleibt der Fall

2.21 $(k,1) = (1,1)$

$$y_1 = s_1 s_1^8$$

$$y_2 = s_1^2 \dots$$

Beginnen $y_1, \dots, y_m$ mit einer Potenz von s_1 und enden $z_1, \dots, z_m$ mit einer Potenz von s_m , so ergibt sich ein Widerspruch wie im Beweis von Satz 2.16. Das ist der Fall bei

(i) s_1^2 bei y_2 nicht standhaft und s_m bei z_1 nicht standhaft

(ii) s_1^2 bei y_2 nicht standhaft, $z_2 = \dots s_m^2$ und s_m^2 nicht standhaft bei z_2 .

(a) s_m bei z_1 sei nicht standhaft.

Es folgt wegen (i), daß s_1^2 bei y_2 standhaft ist. Also tritt s_1 zweimal als standhaftes Zeichen auf. y_1, y_2 müssen gleich einem der z_1 sein. Es gilt $z_1 = \dots s_{m-1}^Y s_m$, wobei s_{m-1}^Y das standhafte Zeichen von z_1 ist. Andernfalls würden nach Hilfssatz 2.13 $z_1, \dots, z_{m-1}$ mit $s_{m-1} s_m$ enden, im Widerspruch zu $\Delta(y_1) = \Delta(y_2) = 2$. Der Index des standhaften Zeichens kann pro Schritt um höchstens 1 sinken (2.12). Wir brauchen also mindestens $m-1$ Schritte, um von s_{m-1} zu s_1 als standhaftem Zeichen zu gelangen (d.h. zu y_1 bzw. y_2). Also hat z_{m-1} die Gestalt

$$z_{m-1} = s_1^\alpha s_m, \alpha = 1, 2, \text{ da } z_{m-1} = y_1 \text{ oder } y_2.$$

Bei z_m sieht die Situation dann folgendermaßen aus:

$$z_m z_{m-1}^{\pm 1} = \dots s_m^\kappa s_{m-1}^{\pm \alpha} \quad \kappa \equiv 1, 2.$$

Ist nun z_m nicht invers zu einem der z_i , $i < m$, so muß z_m ebenfalls s_1 als standhaftes Zeichen besitzen und es ergibt sich ein Widerspruch zur N' -Eigenschaft.

Also ist z_m invers zu einem der z_i , hat also die Gestalt $s_m^{-1} s_1^\beta s_m^\kappa$. Analog zu 2.19 (b) ergibt sich ein Widerspruch, da keines der y_i mit s_m beginnen kann.

(b) s_m ist bei z_1 standhaft.

$$z_1 = s_1^Y s_m$$

$$z_2 = \dots s_m^2$$

Sei nun s_m^2 bei z_2 standhaft. Um s_1 als standhaftes Zeichen zu erhalten, brauchen wir mindestens $m-1$ Schritte von z_1 an, da der Index des standhaften Zeichens pro Schritt um höchstens 1 sinken kann, bis auf die Schritte, wo ein nicht standhaftes Zeichen eingeschoben wird. Hier kann er um höchstens 2 sinken. Es folgt, daß s_1^2 bei y_2 nicht standhaft sein kann und damit beginnen $y_1, \dots, y_m$ mit einer Potenz von s_1 (2.9).

Da wir $m-1$ Schritte von z_1 brauchen, um s_1 als standhaftes Zeichen zu erhalten, muß an einer Stelle $i_0 > 2$ der Index des

standhaften Zeichens um 2 sinken, d.h. es wird ein nicht standhaftes Zeichen am Ende eingeschoben. Nach Hilfssatz 2.13 müssen dann $z_{i_0}, \dots, z_{m-2+i_0}$ mit diesem Zeichen enden und sind alle verschieden. Wegen $i_0 > 2$ muß dann eines der z_i , $i_0 \leq i \leq m-2+i_0$, invers zu z_1 oder z_2 sein. Damit beginnen also z_1 oder z_2 mit dem eingeschobenen Zeichen. Da aber z_1 und z_2 gleich einem der y_j sein müssen, folgt, daß der Index des eingeschobenen Zeichens 1 sein muß, denn die y_i beginnen mit Potenzen von s_1 . Das ist aber unmöglich.

Ist nun s_m^2 nicht standhaft, so folgt wegen (ii), daß s_1^2 bei y_2 standhaft ist und der Beweis erfolgt dual zu dem vorhergehenden.

Somit ist also auch der Fall 2.21 unmöglich.

Das beendet den Beweis von Satz 2.17. $\square$

Wir erhalten noch die folgende Verschärfung von Satz 2.17:

2.22 Satz.

Es sei $G = \langle s_1, \dots, s_m \mid s_i^{\alpha_i} = 1 \rangle$, $m \geq 3$, $\alpha_i \geq 3$, und $\{x_1, \dots, x_n\}$, $n \leq m$, ein System von Elementen aus G , das die N' -Eigenschaft hat. Es gelte eine Gleichung

$$(*) \quad P = \prod_{i=1}^k x_{v_i}^{\varepsilon_i} = y \left(\prod_{i=1}^m s_i \right)^{\alpha} y^{-1}, \quad \alpha > 0, y \in G$$

und mindestens eines der x_{v_i} sei nicht zu einer Potenz von $\prod_{i=1}^m s_i$ konjugiert mit dem Konjugationsfaktor y . Dann ist $\{x_1, \dots, x_n\}$ frei äquivalent zu einem System, das eine der beiden Eigenschaften besitzt:

- (a) Die Anzahl der zu $\left(\prod_{i=1}^m s_i\right)^{\beta}$ konjugierten Elemente ist größer als im ursprünglichen System $\{x_1, \dots, x_n\}$.
- (b) Es gilt $m = n$ und $x_i = s_i^{\beta_i}$, $i = 1, \dots, m$, $(\beta_i, \alpha_i) = 1$.

Beweis. Wegen Hilfssatz 2.2 reicht es, zu zeigen, daß im Falle (b) von Hilfssatz 2.2 immer der Fall (b) des Satzes eintritt. Wir haben im Beweis des Satzes 2.17 zugelassen, daß in P Konjugierte von positiven Potenzen von $\prod_{i=1}^m s_i$ auftreten und gezeigt, daß dann eine Produktdarstellung $(*)$ unmöglich ist. Es bleibt zu zeigen, daß $(*)$ nicht gelten kann, wenn in P Konjugierte zu negativen Potenzen von $\prod_{i=1}^m s_i$ auftreten.

Es gibt also ein x_{i_0} , das in P auftritt mit
 $x_{i_0} = a(s_j^{-1} \dots s_1^{-1} s_m^{-1} \dots s_{j+1}^{-1})^y a^{-1}$, wobei wir uns x_{i_0} in der
 Normalform von 2.6 aufgeschrieben denken.

(a) $m \geq 4$

Wir bilden nun von x_{i_0} beginnend ähnliche Folgen $\{y_i\}$, $\{z_i\}$
 wie in 2.7, 2.11. Es kürzt nach 2.6 (2) das vor x_{i_0} stehende z
 mindestens zwei s_k , ebenso das nach x_{i_0} stehende y . Es kann also
 der Hilfssatz 2.9 angewendet werden und wir erhalten $m-1$ ver-
 schiedene (2.10) y_j , die alle mit $a s_{j+1}$ beginnen und analog
 nach 2.13, 2.14 $m-1$ verschiedene z_j , die alle mit $s_j a^{-1}$ enden.

Wegen $n \leq m$ bilden die y_j bzw. die z_j zusammen mit x_{i_0} bereits
 das ganze System der x_v . Deshalb sind die Mengen $\{y_i\}$ und $\{z_j\}$
 gleich. Es gibt also $m-1$ von x_{i_0} verschiedene Elemente, die mit
 $a s_{j+1}$ beginnen und mit $s_j a^{-1}$ enden. Eines der Elemente muß aber
 mit s_1 beginnen und ein anderes mit s_m enden. Es folgt $a = 1$.

Wegen $\alpha_{j+1} \neq 2$ muß auch das auf $y_{m-1}^{\delta_{m-1}}$ mit $\delta_{m-1} = \pm 1$, je nachdem,
 ob y_{m-1}^{-1} auftritt oder nicht, folgende Zeichen mit einer Potenz
 von s_{j+1} beginnen. Da es es invers zu einem der anderen y_j sein
 muß, beginnt und endet ein y_i mit einer Potenz von s_{j+1} . Also
 $j \equiv j+1$, was ein Widerspruch zu $m \geq 3$ ist.

(b) $m = 3$

Aus 2.6 (2) folgt, daß bei x_{i_0} an einer Seite mindestens zwei
 der s_i^{-1} durch das Nachbarelement beeinflußt werden. OBdA sei
 das hinten der Fall. Aus Hilfssatz 2.9 folgt dann, daß die beiden
 weiteren y_i mit $a s_{j+1}$ beginnen. Andererseits beginnen aber das
 erste Zeichen von P und das auf dieses in der Folge $\{y_i\}$ folgende
 Zeichen mit Potenzen von s_1 . Analog enden z_1, z_2 mit Potenzen von
 s_m , ($\alpha_m \neq 2, \alpha_1 \neq 2$). Da eines der z_i aber mit $s_j a^{-1}$ enden muß,
 folgt wie in (a) $a = 1$ und es ergibt sich wie oben der Wider-
 spruch $j \equiv j+1$.

Damit ist Satz 2.22 bewiesen. $\square$

Es sei hier nun noch der Satz 2 aus [6] zitiert, den wir im
 nächsten Paragraphen brauchen werden.

2.23 Satz.

Es sei $G = \langle s_1, s_2 \mid s_1^{\alpha_1} = s_2^{\alpha_2} = 1 \rangle$, $\alpha_1 \geq \alpha_2$. Ferner seien $x_1, x_2 \in G$ mit $[x_1, x_2] = (s_1 s_2)^\alpha$, $\alpha \neq 0$. Dann ist das System $\{x_1, x_2\}$ frei äquivalent zu einem der folgenden Systeme:

$$(a) \quad \alpha_1 = \alpha_2 = 2, \quad x_1 = (s_1 s_2)^{\beta_1} s_1, \quad x_2 = (s_2 s_1)^{\beta_2} s_2,$$

$$(b) \quad \alpha_1 = 4; \alpha_2 = 2, \quad x_1 = s_1 s_2 s_1, \quad x_2 = s_2 s_1^2,$$

$$(c) \quad \alpha_1 = \alpha_2 = 3, \quad x_1 = s_1 s_2^{-1}, \quad x_2 = s_2^{-1} s_1,$$

$$(d) \quad \alpha_1 = 3; \alpha_2 = 2, \quad x_1 = s_1 s_2 s_1^{-1} s_2, \quad x_2 = s_2 s_1^{-1} s_2 s_1.$$

□

§ 3 Minimale Erzeugendensysteme von Fuchsschen Gruppen

Zuerst ein Hilfssatz aus [8], der die Situation 1.8 (ii) für die von uns betrachteten Gruppen ausschließt.

3.1 Hilfssatz.

Sei $G = \langle s_1, \dots, s_m \mid s_i^{\alpha_i} = s_1 \dots s_m = 1 \rangle = H_1 *_{\mathcal{A}} H_2$ mit

$$H_1 = \langle s_1, \dots, s_1 \mid s_1^{\alpha_1} = 1 \rangle$$

$$H_2 = \langle s_{1+1}, \dots, s_m \mid s_i^{\alpha_i} = 1 \rangle$$

$$A = \langle (s_1 \dots s_1) = (s_{1+1} \dots s_m)^{-1} \rangle.$$

Dabei sei $1, m-1 \geq 2$. Sei $a = s_1 \dots s_1 = (s_{1+1} \dots s_m)^{-1}$.

Eine Gleichung

$$xa^{\gamma}x^{-1} = a^{\beta}, \quad \gamma \neq 0, \quad x \in G$$

läßt nur die folgenden Möglichkeiten zu:

- (a) $x = a^{\delta}, \quad \gamma = \beta,$
- (b) $1 = 2, \quad \alpha_1 = \alpha_2 = 2 \quad x \in H_1, \quad \gamma = -\beta$
- (c) $m-1 = 2, \quad \alpha_{m-1} = \alpha_m = 2 \quad x \in H_2, \quad \gamma = -\beta$
- (d) $1 = m-1 = 2, \quad \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4, \quad \gamma = -\beta$

□

3.2 Hilfssatz.

Sei $G = \langle s_1, \dots, s_m \mid s_i^{\alpha_i} = \prod_{i=1}^m s_i = 1 \rangle, \alpha_i > 2, m \geq 3$.
 $\{x_1, \dots, x_{m-1}\}$ sei ein minimales Erzeugendensystem von G .
 Dann ist keines der x_i konjugiert zu einem s_j^{β} , wobei
 $(\beta, \alpha_j) = d > 1$ ist.

Beweis. Angenommen, es gibt ein solches x_i . Wir führen dann in G die neue Relation $s_j^d = 1$ ein. Dann erhalten wir die Gruppe
 $G' = \langle s_1, \dots, s_m \mid s_i^{\alpha_i} = s_j^d = s_1 \dots s_m = 1 \rangle$, die sich von $m-2$ Elementen erzeugen lassen müßte, im Widerspruch zu [6], denn der Rang von G' ist $m-1$. □

Aus diesem Hilfssatz folgt zusammen mit 2.1, daß wir annehmen können, daß jedes System von Elementen von G , das bei einer Zerlegung von G in ein freies Produkt mit Amalgam in einem der Faktoren liegt, die N' -Eigenschaft bezüglich der in den Faktoren definierten Länge Δ hat.

Wir können nun das Hauptresultat beweisen:

3.3 Satz.

Sei $G = \langle s_1, \dots, s_m \mid s_i^{\alpha_i} = \prod_{i=1}^m s_i = 1 \rangle$, $m \geq 6$, $\alpha_i \geq 3$.
 Sei $\{x_1, \dots, x_{m-1}\}$ ein Erzeugendensystem von G . Dann gibt es einen freien Übergang von $\{x_1, \dots, x_{m-1}\}$ zu einem System der Form $\{s_{v_1}^{\beta_1}, \dots, s_{v_{m-1}}^{\beta_{m-1}}\}$ mit $v_1 < v_2 < \dots < v_{m-1}$ und $(\beta_j, \alpha_{v_j}) = 1$.

Beweis. Wir wählen Faktorisierungen von G in ein freies Produkt mit Amalgam $G = H_1 *_A H_2$ mit

$$\begin{aligned} H_1 &= \langle s_1, \dots, s_k \mid s_i^{\alpha_i} = 1 \rangle \\ H_2 &= \langle s_{k+1}, \dots, s_m \mid s_j^{\alpha_j} = 1 \rangle & k, m-k \geq 3 \\ A &= \langle (s_1 \dots s_k) = (s_{k+1} \dots s_m)^{-1} \rangle \end{aligned}$$

Nun wenden wir auf unser System $\{x_1, \dots, x_{m-1}\}$ die Nielsensche Kürzungsmethode an und erhalten aus dem Satz 1.8 und dem Korollar 1.11 die folgenden Möglichkeiten für ein zu $\{x_1, \dots, x_{m-1}\}$ frei äquivalentes System.

1. Es gibt ein Produkt $P = \prod_{i=1}^l x_{v_i}^{e_i}$ in den x_i , das zu einem Element aus A konjugiert ist. Dabei liegen die $x_{v_i}^{e_i}$ in einer zu einem Faktor H_{i_1} konjugierten Untergruppe und sind nicht alle aus A .
2. Es gibt ein Produkt $P = \prod_{i=1}^s x_{v_i}^{e_i}$, $x_{v_i} \in A$, $P \neq 1$ und in einem Faktor H_{i_1} ein Element $x \notin A$ mit $xPx^{-1} \in A$.
3. Alle x_{v_i} haben eine Länge ≤ 1 . $x_1 = \prod_{i=1}^m s_i$, $x_1, \dots, x_k$ erzeugen H_1 und liegen in H_1 und $x_1, x_{k+1}, \dots, x_{m-1} \in H_2$ und erzeugen H_2 .

Der Fall (2) ist jedoch auf Grund von Hilfssatz 3.1 nicht möglich.

Wir wollen zuerst einen Hilfssatz beweisen.

3.4 Hilfssatz.

Es sei x_1 ein zu einem Element aus A konjugiert. Dann kann keine Situation (1) eintreten, an der x_1 nicht beteiligt ist, d.h. x_1 tritt in dem Produkt P auf.

Beweis. $P = \prod_{i=1}^1 x_{v_i}^{\varepsilon_i}$ beschreibe eine Situation (1), an der x_1 nicht beteiligt ist. Nachdem wir die x_{v_i} geeignet konjugiert haben, was eine freie Äquivalenz beschreibt, können wir Satz 2.22 anwenden, denn wegen 3.2 haben die x_{v_i} die N' -Eigenschaft. Tritt nun Satz 2.22 (a) ein, so erhalten wir ein weiteres x_1 , das zu einem Element aus A konjugiert ist. Durch Einführen der Relation $s_1 \dots s_k = 1$ erhalten wir

$$G' = G'_1 \times G'_2.$$

$$G'_1 = \langle s_1, \dots, s_k \mid s_i^{\alpha_i} = \prod_{i=1}^k s_i = 1 \rangle,$$

$$G' = \langle s_{k+1}, \dots, s_m \mid s_i^{\alpha_i} = \prod_{i=k+1}^m s_i = 1 \rangle$$

G' müßte von $m-3$ Elementen erzeugt werden, was aber wegen [6] und dem Satz von Grushko [8] ein Widerspruch zum Rang von G' ergibt.

Es muß also 2.22 (b) eintreten.

Dann erhalten wir jedoch durch Kürzen des Faktors H_1 , in dem die x_{v_i} liegen, einen Widerspruch zu Satz 3 aus [6]. Denn wir verlieren $m-k+1$ bzw. $k+1$ Erzeugende, da x_1 bei P nicht auftritt.

□

3.5 Hilfssatz.

Es sei x_1 konjugiert zu einem Element aus A und es trete Situation (1) ein. Dann sind k bzw. $m-k$ der x_j gleich gewissen $s_j^{\beta_j}$, $(\beta_j, \alpha_j) = 1$.

Beweis. Nach geeigneter Konjugation können wir 2.22 anwenden. Wie in 3.4 ergibt dann der Fall (a) von 2.22 einen Widerspruch. Aus 2.22 (b) folgt die Behauptung. $\square$

3.6 Hilfssatz.

Es sei $G = H_1 \rtimes_A H_2$ wie oben. x_1 sei aus A . Ferner mögen $x_2, \dots, x_k$ gleich Potenzen von gewissen s_j aus H_1 sein. Dann tritt entweder eine Situation (3) ein oder es tritt (1) in H_2 ein. Analog gilt die Behauptung auch für H_2 .

Beweis. Es möge (3) nicht eintreten. Dann muß also eine Situation (1) eintreten, an der nach Hilfssatz 3.4 x_1 beteiligt ist. Angenommen, es tritt (1) in H_1 ein. Dann sind wegen der Rangformel [6] keine x_i , $i > k$, daran beteiligt. Es gibt ein s_{i_0} in H_1 , das unter $x_2, \dots, x_k$ nicht vorkommt. Ist nun $P = \prod_{i=1}^k x_{v_i}^{e_i}$ ein freigekürztes Produkt in den x_i , das die Situation (1) repräsentiert, so folgt, daß x_1 nicht mit negativen Exponenten auftreten kann, da ein $s_{i_0}^{-1}$ nicht von den $x_2, \dots, x_k$ korrigiert werden kann und außerdem $\alpha_{i_0} \neq 2$ gilt. Es tritt x_1 also nur mit positiven Exponenten auf. Es folgt, daß $x_2, \dots, x_k$ nur im Konjugationsfaktor auftreten können, da die s_i bei x_1 bereits in der richtigen Reihenfolge stehen. Nach dem Beweis von Satz 1 [8] muß dann noch eine Situation (1) bzw. (3) eintreten. $\square$

Unter allen zu $\{x_1, \dots, x_{m-1}\}$ frei äquivalenten Systemen wählen wir nun eines aus, in dem die Anzahl der x_j , die gleich gewissen $s_j^{\beta_j}$, $(\beta_j, \alpha_j) = 1$, sind, maximal ist. 1 bezeichne die Anzahl dieser x_i . Zu zeigen ist $1 = m-1$.

$$1. \quad 1 \geq \left\lceil \frac{m}{2} \right\rceil$$

Wir wählen eine Faktorisierung von G wie oben mit $k = \left\lceil \frac{m}{2} \right\rceil$. Nach geeigneter Verkürzung tritt dann der Fall (1) oder (3) ein. Tritt (3) ein, so folgt die Behauptung aus dem Satz von Grushko. Es möge also (1) eintreten. Nach geeigneter Konjugation tritt dann Satz 2.22 (a) oder (b) ein, im Falle (b) gilt die Behauptung.

tung. Im Falle (a) erhalten wir nach Konjugation ein $x_i \in A$.
Nochmaliges Anwenden von Satz 1.8, 1.11 liefert dann wegen
Hilfssatz 3.5 die Behauptung.

2. $l = m-1$

Angenommen, es gilt $l < m-1$. Da $l \geq \lfloor \frac{m}{2} \rfloor$ wegen 1. ist, gibt es
eine Faktorisierung von $G = H_1 \rtimes_A H_2$ mit

$$H_1 = \langle s_j, \dots, s_k \mid s_i^{\alpha_i} = 1 \rangle$$

$$H_2 = \langle s_1, \dots, s_{j-1}, s_{k+1}, \dots, s_m \mid s_i^{\alpha_i} = 1 \rangle$$

$$A = \langle (s_j \dots s_k) = (s_{k+1} \dots s_m s_1 \dots s_{j-1})^{-1} \rangle$$

(eventuell wird ein s_i durch s_i^{-1} ersetzt.)

Dabei liegen in jedem Faktor gewisse x_i , die gleich Potenzen
von s_j sind und s_1 , die unter den x_i , die gleich s_j -Potenzen
sind, nicht auftreten.

Wir verkürzen nun das System bezüglich dieser Faktorisierung.
Dabei bleiben die x_i , die gleich s_i -Potenzen sind, erhalten,
da sie die Länge 1 haben. Es könnte höchstens eines nach A
gelangen.

In dem Falle wenden wir Satz 1.8, 1.11 an und erhalten beim
Entreten von (3) einen Widerspruch zur Maximalität von 1 und
beim Eintreten von (1) folgt der Widerspruch aus den Hilfs-
sätzen 3.6, 3.4 und 3.5.

Wegen des Satzes von Grushko kann (3) also nicht eintreten.

Tritt dann (1) ein, so müssen an der Situation gewisse x_j , die
bereits zu s_i -Potenzen konjugiert sind, beteiligt sein. Ändern-
falls ergibt ein Anwenden von 2.22 einen Widerspruch zur Rang-
formel [6]. Es müssen die an (1) beteiligten x_i also bereits
in einem der Faktoren liegen und wir können 2.22 anwenden, ohne
die x_i konjugieren zu müssen. Der Fall (a) von 2.22 führt dann
wie oben zu einem Widerspruch (3.4, 3.5).

Im Falle (b) erhalten wir ebenfalls einen Widerspruch zur
Maximalität von 1, da in jedem Faktor s_i lagen, die unter den x_i ,
die gleich s_j -Potenzen waren, nicht vorkommen. Es folgt $l = m-1$
und damit die Behauptung von Satz 3.3. $\square$

Der Satz 3.3 macht eine Aussage nur für den Fall $m \geq 6$. Die Fälle $m = 5$ und $m = 4$ enthalten bei einer Faktorisierung von G in ein freies Produkt mit Amalgam einen Faktor, der freies Produkt von nur zwei zyklischen Gruppen ist. Das Problem ist es, den Satz 2.22, der ja die Voraussetzung $m \geq 3$ macht, auch auf diesen Fall zu übertragen. Wird die Gleichung $\prod_{i=1}^k x_{v_i}^{\epsilon_i} = \prod_{i=1}^k s_i$ alternierend, so liefert der Satz 2 aus [6] eine Lösung. Leider können wir keine Aussage machen, falls etwas ähnliches wie in 2.22 (a) eintritt, also eines der beteiligten x_i konjugiert zu einem Element aus dem Amalgam ist. Einige Spezialfälle für $m = 4$ sind in [7] Satz 20 behandelt. Es liegt die Vermutung nahe, daß ein ähnlicher Satz wie 3.3 auch für $m = 4$ und $m = 5$ gilt.

Aus Satz 2.22 folgen zusammen mit [8] Satz 5 bzw. [5] Satz 5 die Resultate von G. Rosenberger ([7], Satz 13, Satz 14) für den Spezialfall $m \geq 3$ und $\alpha_i \neq 2$. Der Beweis verläuft ähnlich dem von Satz 3.3.

Literatur

- [1] J. Chiswell, Abstract Length functions in groups,
Preprint
- [2] R. C. Lyndon, Length functions in groups. Math. Scand. 12
(1963), 209-237
- [3] Magnus, Karrass, Solitar, Combinatorial group theory:
Presentations of groups in terms of generators
and relations. New York-London-Sydney: John Wiley
& Sons, Inc. 1966
- [4] J. Nielsen, A basis for subgroups of free groups,
Math. Scand. 3 (1955), 31-43
- [5] N. Peczynski, Eine Kennzeichnung der Relationen der
Fundamentalgruppe einer nicht-orientierbaren
geschlossenen Fläche, Diplomarbeit, Bochum 1972
- [6] N. Peczynski, G. Rosenberger, H. Zieschang, Über Erzeugende
ebener diskontinuierlicher Gruppen, Invent. Math.
29 (1975), 161-180
- [7] G. Rosenberger, Zum Rang- und Isomorphieproblem für freie
Produkte mit Amalgam, Habilitationsschrift,
Hamburg 1974
- [8] H. Zieschang, Über die Nielsensche Kürzungsmethode in
freien Produkten mit Amalgam, Invent. Math. 10
(1970), 4-37
- [9] H. Zieschang, E. Vogt, D. Coldewey, Flächen und ebene
diskontinuierliche Gruppen, Lecture Notes 122
(1970)

Lebenslauf

Geburtsdatum und -ort	27. Juli 1948 in Dortmund
Eltern	Marian Peczynski und Frau Hildegard geborene Schneider
Geschwister	eine jüngere Schwester, Christel, und ein jüngerer Bruder, Ulrich
Familienstand	verheiratet seit 20.3.1970 mit Gabriele Peczynski geborene Budde
Kinder	zwei, eine Tochter, Kaja, 1.10.1970, und einen Sohn, Mirko, 14.9.1974
Ausbildung	
Grundschule	April 1955 - März 1959 Gertrudisschule in Dortmund
Oberschule	April 1959 - Juli 1967 Helmholtz-Gymnasium in Dortmund
Studium	WS 1967/68 - WS 1971/72 Studium der Mathematik und Wirt- schaftswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum Diplomprüfung in Mathematik Februar 1972 September 1973 - Mai 1974 Studium der Mathematik an der University of Michigan, Ann Arbor Seit Mai 1974 Studium der Mathematik an der Ruhr-Universität Bochum

